



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Cálculo Diferencial e Integral III — Lista 2
Prof. Adriano Barbosa

- (1) Use uma tabela de valores de $f(x, y)$ para (x, y) próximos da origem e estime o valor de $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x, y)$ para as funções abaixo:
- (a) $f(x, y) = \frac{x^2y^3 + x^3y^2 - 5}{2 - xy}$
- (b) $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$
- (2) Se $\lim_{(x,y)\rightarrow(3,1)} f(x, y) = 6$, o que podemos dizer sobre o valor de $f(3, 1)$? E se f for contínua?
- (3) Determine o conjunto de pontos onde as funções são contínuas:
- (a) $f(x, y) = \frac{xy}{1 + e^{x-y}}$
- (b) $f(x, y) = \frac{1 + x^2 + y^2}{1 - x^2 - y^2}$
- (c) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$
- (d) $f(x, y) = \sqrt{y - x^2} \ln z$
- (4) Calcule as derivadas parciais das funções:
- (a) $f(x, y) = y^5 - 3xy$
- (b) $f(x, t) = e^{-t} \cos(\pi x)$
- (c) $z = (2x + 3y)^{10}$
- (d) $f(x, y) = \frac{x}{y}$
- (e) $w = \ln(x + 2y + 3z)$
- (f) $F(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt$
- (5) Calcule as segundas derivadas parciais das funções:
- (a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$
- (b) $w = \sqrt{u^2 + v^2}$
- (c) $v = e^{xe^y}$
- (6) Determine o sinal das derivadas parciais para a função cujo gráfico está abaixo:
- (a) $f_x(1, 2)$
- (b) $f_x(-1, 2)$
- (c) $f_y(1, 2)$
- (d) $f_y(-1, 2)$

