



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Cálculo Diferencial e Integral — Avaliação PS
Prof. Adriano Barbosa

Eng. de Energia

26/07/2018

1	
2	
3	
4	
5	
Nota	

Aluno(a):.....

Todas as respostas devem ser justificadas.

Avaliação P1:

1. Calcule os limites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$$

2. Determine o maior domínio de $f(x) = \frac{2x+1}{4x^2+4x+5}$ e os valores de x para os quais f é contínua.

3. Calcule a derivada das funções abaixo:

$$(a) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$(b) f(x) = x^2 \cos(3x)$$

4. Dada $y = \cos(\sin(1+x^2))$. Calcule $\frac{dy}{dx}$.


5. Use derivação implícita para calcular $\frac{dy}{dx}$, onde $2\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3$.

Avaliação P2:

1. Ao meio dia o navio A está 100km a oeste do navio B. Sabendo que o navio A viaja para sul a 35km/h e o navio B viaja para norte a 25km/h, quanto rápido eles estão se distanciando as 16h?


2. Encontre f tal que $f''(t) = \sin t + \cos t$, $f(0) = 3$ e $f'(0) = 4$.

3. Calcule a integral $\int_0^4 (4-x)\sqrt{x} dx$.



4. Qual a menor distância vertical entre as parábolas $y = x^2 + 1$ e $y = x - x^2$?

5. O gráfico de f é dado abaixo. Calcule as integrais definidas:



$$(a) \int_0^5 f(x) \, dx \quad (b) \int_2^7 f(x) \, dx$$

Boa Prova!

$$\textcircled{1} \quad a) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x}-3}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x}+3} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} b) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{x-3} \cdot \frac{\sqrt{x+6}+3}{\sqrt{x+6}+3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+6)-3^2}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+6-9}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+6}+3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

\textcircled{2} A função f está definida para todo x tal que $4x^2+4x+5 \neq 0$. Como $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 5 = -64$, não existe x real tal que $4x^2+4x+5=0$. Assim, o domínio de f é \mathbb{R} . Além disso, como f é racional, é contínua em seu domínio.

$$\textcircled{3} \quad a) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{3\sqrt[3]{x}} = x^{-1/2} - x^{-1/3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2} + \frac{1}{3}x^{-4/3}$$

$$b) \quad f(x) = x^2 \cos(3x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x \cos(3x) + x^2 (-\sin(3x)) \cdot 3 = 2x \cos(3x) - 3x^2 \sin(3x)$$

\textcircled{4} Aplicando a regra da corda:

$$y' = -\sin(1+x^2) \cdot \cos(1+x^2) \cdot 2x$$


$$= -2x \sin(1+x^2) \cdot \cos(1+x^2)$$

\textcircled{5} Derivando implicitamente:


$$2\sqrt{x} + \sqrt{y} = 3 \Rightarrow 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2\sqrt{y}}{2\sqrt{x}}$$

Avaliação P2



Indicando por $x(t)$ e $y(t)$ a distância percorrida pelos navios, temos $\frac{dx}{dt} = 35$ e $\frac{dy}{dt} = 25$. Se z indica a distância entre os navios, por Pitágoras,



$z^2 = 100^2 + (x+y)^2$ (I). Queremos determinar $\frac{dz}{dt}$ 4h após o início da viagem, ou seja, quando $x = 4 \cdot 35 = 140$ km e $y = 4 \cdot 25 = 100$ km. Derivando (I), temos:

$$2z \frac{dz}{dt} = 0 + 2(x+y) \left(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} \right) \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{(x+y)(\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt})}{z}$$

As 16 h :

$$z^2 = 100^2 + (140+100)^2 = 67600 \Rightarrow z = 260 \text{ km}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{(140+100)(35+25)}{260} = \frac{14400}{260} = \frac{720}{13} \text{ km/h}$$


$$② f''(t) = \sin t + \cos t \Rightarrow f'(t) = -\cos t + \sin t + C_1 \Rightarrow f(t) = -\sin t - \cos t + C_1 t + C_2$$

$$\therefore f(0) = -\cos 0 + \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 5$$

$$\text{e } f(0) = -\sin 0 - \cos 0 + 5 \cdot 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = 4$$

Portanto, $f(t) = -\sin t - \cos t + 5t + 4$.

$$\begin{aligned} ③ \int_0^4 (4-x) \sqrt{x} dx &= \int_0^4 (4-x) x^{1/2} dx = \int_0^4 4x^{1/2} - x^{3/2} dx = 4 \int_0^4 x^{1/2} dx - \int_0^4 x^{3/2} dx \\ &= 4 \left(\frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 \right) - \frac{2}{5} x^{5/2} \Big|_0^4 = 4 \left(\frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} - \frac{2}{3} \cdot 0^{3/2} \right) - \left(\frac{2}{5} \cdot 4^{5/2} - \frac{2}{5} \cdot 0^{5/2} \right) \\ &= 4 \cdot \frac{16}{3} - \frac{64}{5} = \frac{320 - 192}{15} = \frac{128}{15} \end{aligned}$$



Sejam P um ponto na parábola $y = x^2 + 1$ e Q um ponto na parábola $y = x - x^2$. Logo,
 $P = (x, x^2 + 1)$ e $Q = (x, x - x^2)$.

A distância vertical entre P e Q é dada por:

$$D(x) = (x^2 + 1) - (x - x^2) = 2x^2 - x + 1$$

Calculando os números críticos de $D(x)$:

$$D'(x) = 4x - 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$


$$\therefore D'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$$

Aplicando o teste do 2º derivado:

$$D''(x) = 4 \Rightarrow D''\left(\frac{1}{4}\right) = 4 > 0$$


Portanto, $D(x)$ tem um mínimo local em $x = \frac{1}{4}$. Assim, a menor distância entre as parábolas é $D\left(\frac{1}{4}\right) = 2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \frac{7}{8}$.

⑤ a)



$$\begin{aligned} \int_0^5 f(x) dx &= \text{área do trapézio} + \text{área do retângulo} \\ &\quad + \text{área do triângulo} \\ &= \frac{(1+3) \cdot 2}{2} + 1 \cdot 3 + \frac{2 \cdot 3}{2} = 10 \end{aligned}$$

b)



$$\begin{aligned} \int_2^5 f(x) dx &= \text{área do trapézio} - \text{área do triângulo} \\ &= \frac{(1+3) \cdot 3}{2} - \frac{2 \cdot 3}{2} = 3 \end{aligned}$$