



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Cálculo Diferencial e Integral III — Avaliação PS
Prof. Adriano Barbosa

Engenharia Mecânica

25/06/2019

1	
2	
3	
4	
5	
Nota	

Aluno(a):

Todas as respostas devem ser justificadas.

Resolva apenas a avaliação referente a sua menor nota.

Avaliação P1:

1. Calcule as derivadas parciais de $f(x, y) = 1 + x \ln(xy - 5)$.
2. Dada $z = \sin \theta \cos \phi$, onde $\theta = st^2$, $\phi = s^2t$, calcule $\frac{\partial z}{\partial s}$ e $\frac{\partial z}{\partial t}$.
3. Determine a taxa de variação máxima de $f(x, y) = 4y\sqrt{x}$ no ponto $(4, 1)$ e a direção em que isso ocorre.
4. Encontre os pontos de máximo local, mínimo local e de sela de $f(x, y) = xy(1 - x - y)$.
5. Encontre os três números positivos cuja soma é 12 e cuja soma dos quadrados seja a menor possível.

Avaliação P2:

1. Calcule a integral dupla $\iint_D x \, dA$, onde $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \cos x\}$.
2. Descreva o sólido cujo volume é dado pela integral $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$ e determine o valor dessa integral.
3. Calcule a integral $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} \, dV$, onde E é a região delimitada pelo paraboloide $y = x^2 + z^2$ e pelo plano $y = 4$.
4. Dada $F(x, y) = (3 + 2xy, x^2 - 3y^2)$
 - (a) Determine se F é conservativo. Caso positivo, determine a função potencial de F .
 - (b) Calcule a integral $\int_C F \cdot dr$, onde C é o caminho $r(t) = (te^{\sqrt{t}}, te^t)$, $0 \leq t \leq 1$.
5. Use o Teorema de Green para provar a fórmula da área do círculo de raio r , $x^2 + y^2 = r^2$.
[Lembre que: $\iint_D dA = \frac{1}{2} \int_C -y \, dx + x \, dy$]

Avaliação P1

① $f(x,y) = 1 + x \ln(xy-5)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 \cdot \ln(xy-5) + x \cdot \frac{1}{xy-5} \cdot y = \ln(xy-5) + \frac{xy}{xy-5}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \cdot \frac{1}{xy-5} \cdot x = \frac{x^2}{xy-5}.$$

②

$$\begin{array}{ccc} z & & z = \sin \theta \cdot \cos \phi \\ / \quad \backslash & & \\ \theta & \phi & \theta = st^2 \\ / \quad \backslash \quad / \quad \backslash & & \phi = s^2 t \\ s & t & s & t \end{array}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial \phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial s} = \cos \theta \cdot \cos \phi \cdot t^2 - \sin \theta \cdot \sin \phi \cdot 2st$$

$$e \quad \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial \phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial t} = \cos \theta \cdot \cos \phi \cdot 2st - \sin \theta \cdot \sin \phi \cdot s^2.$$

③ A taxa de var. máxima é dada por $\|\nabla f(4,1)\|$ e a direção em que ocorre é $\nabla f(4,1)$. Assim,

$$\nabla f = \left(\frac{2y}{x}, 4\sqrt{x} \right) \Rightarrow \nabla f(4,1) = \left(\frac{2 \cdot 1}{\sqrt{4}}, 4 \cdot \sqrt{4} \right) = (1, 8)$$

$$\Rightarrow \|\nabla f(4,1)\| = \sqrt{1^2 + 8^2} = \sqrt{65}.$$

④ Calculando os pontos críticos:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y(1-x-y) + xy(-1) = y(1-x-y) - xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x(1-x-y) + xy(-1) = x(1-x-y) - xy$$

São polinomiais, logo estão definidas para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Assim, os pontos críticos são as soluções do sistema

$$\begin{cases} y(1-x-y) - xy = 0 \quad (1) \\ x(1-x-y) - xy = 0 \quad (2) \end{cases} \Rightarrow y(1-x-y) - xy = x(1-x-y) - xy$$

(+xy)

$$\Rightarrow y(1-x-y) = x(1-x-y) \Rightarrow y(1-x-y) - x(1-x-y) = 0 \Rightarrow (y-x)(1-x-y) = 0$$

$$\Rightarrow y-x=0 \quad \text{ou} \quad 1-x-y=0$$

Se $y-x=0$, temos $x=y$ e subst. em (1):

$$x(1-x-x) - x \cdot x = 0 \Rightarrow x(1-2x) - x^2 = 0 \Rightarrow x[(1-2x)-x] = 0$$

$$\Rightarrow x[1-3x] = 0 \Rightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad 1-3x=0 \Rightarrow x=\frac{1}{3} \quad \text{ou} \quad x=\frac{1}{3}$$

$$\therefore x=0 \Rightarrow y=0 \quad \text{e} \quad x=\frac{1}{3} \Rightarrow y=\frac{1}{3}.$$

Se $1-x-y=0$, temos $y=1-x$ e subst. em (1):

$$(1-x) \cdot 0 - x(1-x) = 0 \Rightarrow x(1-x) = 0 \Rightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=1.$$

$$\therefore x=0 \Rightarrow y=1 \quad \text{e} \quad x=1 \Rightarrow y=0.$$

Portanto, os pontos críticos de f são $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$ e $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Aplicando o teste da 2ª derivada:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = (1-x-y) + y(-1) - x = 1-2x-2y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -2x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (1-x-y) + x(-1) - y = 1-2x-2y$$

$$\Rightarrow D(x,y) = \begin{vmatrix} -2y & 1-2x-2y \\ 1-2x-2y & -2x \end{vmatrix} = 4xy - (1-2x-2y)^2$$

$$\therefore D(0,0) = -1 < 0 \Rightarrow (0,0) \text{ é pto de sela}$$

$$D(0,1) = -1 < 0 \Rightarrow (0,1) \text{ é pto de sela}$$

$$D(1,0) = -1 < 0 \Rightarrow (1,0) \text{ é pto de sela}$$

$$D(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{4}{9} - \left(1 - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} - \left(\frac{3-2-2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} - \frac{1}{9}$$

$$= \frac{1}{3} > 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = -\frac{2}{3} < 0 \Rightarrow (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \text{ é pto de máx. local.}$$

⑤ Queremos $x, y, z > 0$ tais que $x + y + z = 12$ e que $x^2 + y^2 + z^2$ tenha o menor valor possível. Aplicando o método das M.H. de Lagrange, sejam

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{e} \quad g(x, y, z) = x + y + z$$

$$\Rightarrow \nabla f = (2x, 2y, 2z) \quad \text{e} \quad \nabla g = (1, 1, 1)$$

$$\therefore \begin{cases} 2x = \lambda & (1) \\ 2y = \lambda & (2) \\ 2z = \lambda & (3) \\ x + y + z = 12 & (4) \end{cases}$$

De (1) e (2), temos: $2x = 2y \Rightarrow x = y$.

De (2) e (3), temos: $2y = 2z \Rightarrow y = z$

Substituindo em (4):

$$x + x + x = 12 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow z = 4.$$

Avaliação P2

① Dado $\mathcal{D} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \cos x\}$

$$\iint_{\mathcal{D}} x \, dA = \int_0^{\pi} \int_0^{\cos x} x \, dy \, dx = \int_0^{\pi} x \left(y \Big|_0^{\cos x} \right) \, dx = \int_0^{\pi} x (\cos x - 0) \, dx$$

$$= \int_0^{\pi} x \cos x \, dx \quad \left(\begin{array}{l} \text{Por partes:} \\ u = x \quad \Rightarrow \quad du = dx \\ dv = \cos x \, dx \quad v = \sin x \end{array} \right)$$

$$= x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x \, dx = \pi \cdot \sin \pi - 0 \cdot \sin 0 + \cos x \Big|_0^{\pi} = \cos \pi - \cos 0 = -2$$

② Temos que $\mathcal{D} = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi\}$ descreve, em coord. esféricas, a metade de uma esfera sólida de centro na origem e raio 1 que está localizada a direita do plano xz (semi-espaco $y \geq 0$).

Nota que a integral calcula o volume de E , ou seja,

$$\frac{\frac{4}{3}\pi \cdot 1^3}{2} = \frac{2}{3}\pi.$$

Calculando a integral:

$$\begin{aligned} & \int_0^{\pi} \int_0^{\pi} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \int_0^{\pi} \sin \phi \, d\phi \cdot \int_0^{\pi} d\theta \cdot \int_0^1 \rho^2 \, d\rho \\ &= \left(-\cos \phi \Big|_0^{\pi} \right) \cdot \left(\theta \Big|_0^{\pi} \right) \cdot \left(\frac{\rho^3}{3} \Big|_0^1 \right) = (-\cos \pi + \cos 0) \cdot (\pi - 0) \cdot \left(\frac{1}{3} - 0 \right) = \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

④ a) Queremos f tal que $\nabla f = F$:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3 + 2xy & (1) \\ \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 3y^2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow f(x, y) = 3x + x^2y + C(y)$$


Subst. em (2):

$$x^2 - 3y^2 \stackrel{(2)}{=} \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + C'(y) \Rightarrow C'(y) = -3y^2 \Rightarrow C(y) = -y^3$$

Portanto, $f(x,y) = 3x + x^2y - y^3$ é uma função potencial de \mathbf{F} e \mathbf{F} é conservativo.

b) Pelo Teo. Fund. das Int. de Linha:


$$\begin{aligned}\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(1)) - f(\mathbf{r}(0)) = f(e, e) - f(0, 0) \\ &= (3e + e^2 \cdot e - e^3) - (3 \cdot 0 + 0^2 \cdot 0 - 0^3) = 3e\end{aligned}$$



Temos que $C: \mathbf{r}(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

$$\therefore \text{área} = \iint_D dA \stackrel{\text{(Green)}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (-r \sin t)(-r \cos t) + (r \cos t)(r \sin t) dt$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 dt = \frac{1}{2} r^2 \cdot (t \Big|_0^{2\pi}) = \frac{1}{2} r^2 2\pi = \pi r^2.$$



Temos que:

$$E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z \leq 4 \text{ e } (x, y) \in D\}$$

onde

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$\Rightarrow D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\} \text{ em coord. polares}$$

Logo,

$$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dV = \iint_D \left[\int_{x^2+y^2}^4 \sqrt{x^2 + y^2} dy \right] dA$$

$$= \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \left(y \Big|_{x^2+y^2}^4 \right) dA = \iint_D 4\sqrt{x^2 + y^2} - (x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} dA$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4\sqrt{r^2} - r^2 \sqrt{r^2}) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 4r^2 - r^4 dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^2 4r^2 - r^4 dr = 2\pi \cdot \left(\frac{4r^3}{3} - \frac{r^5}{5} \Big|_0^2 \right) = 2\pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{128\pi}{15}$$