



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Álgebra Linear e Geometria Analítica — Avaliação PS
Prof. Adriano Barbosa

Eng. Mecânica

31/10/2022

1	
2	
3	
4	
5	
Nota	

Aluno(a):.....

Todas as respostas devem ser justificadas.

Avaliação P1:

1. Para quais valores de a o sistema abaixo **não** admite solução?

$$\begin{cases} x + 2y - & 3z = 4 \\ 3x - y - & 2z = -5 \\ 4x + y + (a^2 - 14)z = a + 2 \end{cases}$$

2. Encontre todos os valores de a , b e c tais que A é simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 2 & a - 2b + 2c & 2a + b + c \\ 2 & -1 & a + c \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Dadas constantes reais $a \neq 0$ e $b \neq 0$, explique sem calcular o determinante por que quando $x = a$ e $y = 0$ a igualdade abaixo é válida.

$$\begin{vmatrix} x^2 & x & a \\ a^2 & a & a \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = 0$$

4. Determine o valor de n para que o ângulo entre as retas seja $\frac{\pi}{6}$:

$$r_1 : \frac{x-2}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{3} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} y = nx + 5 \\ z = 2x - 2 \end{cases}$$

5. Encontre a equação implícita do plano que contém as retas

$$r_1 : \begin{cases} y = 2x - 3 \\ z = -x + 2 \end{cases} \quad \text{e} \quad r_2 : \begin{cases} \frac{x-1}{3} = z - 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

Avaliação P2:

1. Determine uma base e a dimensão dos subespaços de \mathbb{R}^4 :

- (a) Conjunto dos vetores da forma (a, b, a, b) , $a, b \in \mathbb{R}$
(b) Conjunto dos vetores da forma $(a, a-b, b+c, c)$, $a, b, c \in \mathbb{R}$

2. Encontre a matriz canônica da transformação linear resultante de uma rotação de $\frac{\pi}{3}$ radianos no sentido anti-horário seguida de uma reflexão em torno do eixo x .

3. Determine se o operador linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (3x + 4y, 2x + y)$ é invertível e calcule sua inversa, se possível.

Lembre que: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

4. Calcule os autovalores e os autovetores da matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

5. Calcule A^{10} , onde $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Soluções P1

$$\textcircled{1} \quad \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & -2 & -5 \\ 4 & 1 & a^2-14 & a+2 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{L_2 \rightarrow L_2 - 3L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 4L_1}} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 7 & -17 \\ 0 & -7 & a^2-2 & a-14 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L_3 \rightarrow L_3 - L_2} \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 7 & -17 \\ 0 & 0 & a^2-9 & a+3 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ -7y + 7z = -17 \\ (a^2-9)z = a+3 \end{cases}$$

$z = \frac{a+3}{a^2-9}$ desde que $a^2-9 \neq 0 \Rightarrow$ o sistema tem única sol.

$$a^2-9 = 0 \Leftrightarrow (a-3)(a+3) = 0 \Leftrightarrow a = -3 \text{ ou } a = 3.$$

$P/a = 3 : (3^2-9)z = 3+3 \Rightarrow 0=6 \Rightarrow$ o sistema não tem sol.

$P/a = -3 : [(-3)^2-9]z = -3+3 \Rightarrow 0=0 \Rightarrow$ o sistema tem inf. sol.

Portanto, o sistema não tem sol. quando $a = 3$.

\textcircled{2} A é simétrica se

$$\begin{cases} a-2b+2c = 2 & \textcircled{1} \\ 2a+b+c = 0 & \textcircled{2} \\ a+c = -1 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \Rightarrow c = -1-a$$

$$\text{Substituindo em } \textcircled{2} : 2a+b-1-a=0 \Rightarrow b=1-a$$

$$\text{Substituindo em } \textcircled{1} : a-2(1-a)+2(-1-a)=2 \Rightarrow a-2+2a-2-2a=2 \\ \Rightarrow a=6$$

$$\Rightarrow b=1-6 \Rightarrow b=-5$$

$$\Rightarrow c=-1-6 \Rightarrow c=-7$$

③ Quando $x=a$:

$$\begin{vmatrix} a^2 & a & a \\ a^2 & a & a \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = 0, \text{ pois a matriz tem duas linhas iguais.}$$

Quando $x=0$:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ a^2 & a & a \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = 0, \text{ pois as linhas 1 e 3 são múltiplas.}$$

Multiplicando a linha 1 por $\frac{b}{a}$ obtemos a linha 3.

④

$$r_1: \begin{cases} t = \frac{x-2}{4} \\ t = \frac{y}{5} \\ t = \frac{z}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-2 = 4t \\ y = 5t \\ z = 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2+4t \\ y = 5t \\ z = 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$$r_2: (x, nx+5, 2x-2) \Rightarrow \begin{cases} x = s \\ y = 5+ns \\ z = -2+2s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$$

O vetor diretor de r_1 é $\sigma_1 = (4, 5, 3)$ e o vetor diretor de r_2 é $\sigma_2 = (1, n, 2)$.

$$\|\sigma_1\| = \sqrt{16+25+9} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \quad \text{e} \quad \|\sigma_2\| = \sqrt{1+n^2+4} = \sqrt{n^2+5}$$

$$\therefore \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle}{\|\sigma_1\| \cdot \|\sigma_2\|} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4+5n+6}{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{n^2+5}} \Rightarrow 5\sqrt{6(n^2+5)} = 2(5n+10)$$

$$\Rightarrow 5\sqrt{6(n^2+5)} = 2 \cdot 5(n+2) \Rightarrow 6(n^2+5) = 4(n+2)^2$$

$$\Rightarrow 3(n^2+5) = 2(n^2+4n+4) \Rightarrow 3n^2+15 = 2n^2+8n+8$$

$$\Rightarrow n^2 - 8n + 7 = 0 \Rightarrow n = 7 \text{ ou } n = 1$$

⑤ $r_1: (x, 2x-3, -x+2) \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

$$r_2: \begin{cases} s = \frac{x-1}{3} \\ s = z-1 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + 3s \\ y = -1 \\ z = 1 + s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$$

Os vetores diretores de r_1 e r_2 são $\nu_1 = (1, 2, -1)$ e $\nu_2 = (3, 0, 1)$, respectivamente. Assim, $n = \nu_1 \times \nu_2$ é normal ao plano:

$$n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (2, -(1+3), -6) = (2, -4, -6).$$

Precisamos agora de um ponto do plano. Tomando $t=0$ em r_1 , $P=(0, -3, 2) \in r_1$, logo é também um ponto do plano.

Portanto,

$$2x - 4y - 6z = d, \text{ onde } d = 2 \cdot 0 - 4 \cdot (-3) - 6 \cdot 2 = 0$$

$$\therefore 2x - 4y - 6z = 0.$$

Solução P2

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ a) } (a, b, a, b) &= (a, 0, a, 0) + (0, b, 0, b) \\ &= a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1) \end{aligned}$$

$\therefore \beta = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$ gera o subespaço.

Além disso, os vetores são LI, pois não são múltiplos, caso contrário teríamos

$$(1, 0, 1, 0) = k(0, 1, 0, 1) \Rightarrow \begin{cases} 1 = 0 \\ 0 = k \\ 1 = 0 \\ 0 = k \end{cases} .$$

Portanto, β é uma base e a dim. do subespaço é 2.

$$\begin{aligned} \text{b) } (a, a-b, b+c, c) &= (a, a, 0, 0) + (0, -b, b, 0) + (0, 0, c, c) \\ &= a(1, 1, 0, 0) + b(0, -1, 1, 0) + c(0, 0, 1, 1) \end{aligned}$$

$\therefore \beta = \{(1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\}$ gera o subespaço.

Verificando se são LI:

$$a(1, 1, 0, 0) + b(0, -1, 1, 0) + c(0, 0, 1, 1) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a - b = 0 \\ b + c = 0 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c = 0 \end{cases} \quad \therefore \beta \text{ é LI.}$$

Portanto, β é base do subespaço e sua dim. é 3.

② Temos que:

$$[R_{\pi/3}] = \begin{bmatrix} \cos \pi/3 & -\sin \pi/3 \\ \sin \pi/3 & \cos \pi/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad (\text{rotacão})$$

$$[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (\text{reflexão})$$

$$\therefore [\tau] = [R_x][R_{\pi/3}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 \end{bmatrix}.$$

$$③ [\tau] = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det([\tau]) = 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 = -5 \neq 0 \quad \therefore \tau \text{ é invertível.}$$

$$[\tau^{-1}] = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 & 4/5 \\ 2/5 & -3/5 \end{bmatrix} \quad \therefore \tau^{-1}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\tau^{-1}(x, y) = \left(\frac{-x+4y}{5}, \frac{2x-3y}{5} \right).$$

$$④ \det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(2-\lambda)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 3 \text{ ou } \lambda = 2.$$

Logo,

$$p/\lambda=3 : A-3I = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2y+z=0 \\ -y=0 \\ -y-z=0 \end{cases} \Rightarrow y=0 \Rightarrow z=0$$

$$\therefore (x, 0, 0), x \in \mathbb{R}$$

$$p/\lambda=2 : A-2I = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+2y+z=0 \\ 0=0 \\ -y=0 \end{cases} \Rightarrow y=0$$

$$\therefore (x, 0, -x), x \in \mathbb{R}.$$

$$\textcircled{5} \quad \det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(-\lambda) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda + \lambda^2 - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = -1 \quad \therefore A \text{ é diagonalizável.}$$

\Rightarrow existe P tq $A = PDP^{-1}$.

$$P/\lambda=2: \quad A-2I = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x+2y=0 \\ x-2y=0 \end{cases} \Rightarrow x=2y \quad \therefore (2y, y), y \in \mathbb{R}$$

$$P/\lambda=-1: \quad A-(-1)I = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{cases} 2x+2y=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Rightarrow y=-x \quad \therefore (x, -x), x \in \mathbb{R}$$

Tomando

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{-2-1} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \text{ e } D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} A^{10} &= P D^{10} P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^{10} & 0 \\ 0 & (-1)^{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1024 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2048 & 1 \\ 1024 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & -2/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2048/3 & 2046/3 \\ 1023/3 & 1026/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 683 & 682 \\ 341 & 342 \end{bmatrix} \end{aligned}$$