



UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Cálculo de Várias Variáveis — Avaliação P2
Prof. Adriano Barbosa

Matemática


19/04/2023

1	
2	
3	
4	
5	
Nota	

Aluno(a):.....

Todas as respostas devem ser justificadas.

1. Calcule a integral dupla $\iint_R y \sin(xy) dA$, $R = [1, 2] \times [0, \pi]$.
2. Esboce ou descreva a região cuja área é dada pela integral $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_1^2 r dr d\theta$ e calcule-a.
3. Calcule a integral $\iint_D \sin(y^2) dA$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$.
4. (a) Escreva a integral tripla de uma função contínua $f(x, y, z)$ sobre o sólido abaixo determinando seus limites de integração.
(b) Calcule o volume do sólido utilizando a integral tripla encontrada no item anterior.




5. Calcule $\iiint_E x^2 + y^2 dV$, onde E está entre as superfícies $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Solução P2

$$\begin{aligned}
 ① \quad & \iint_D y \sin(xy) dA = \int_0^{\pi} \int_1^2 y \sin(xy) dx dy = \int_0^{\pi} y \left[\frac{-\cos(xy)}{y} \right]_1^2 dy \\
 &= \int_0^{\pi} -\cos(2y) + \cos(y) dy = -\frac{\sin(2y)}{2} + \sin(y) \Big|_0^{\pi} \\
 &= -\frac{\sin(2\pi)}{2} + \sin(\pi) + \frac{\sin(0)}{2} - \sin(0) = 0.
 \end{aligned}$$

② A região de integração é


$$D = \{(r, \theta) \mid 1 \leq r \leq 2, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}\}$$



Calculando a integral:

$$\begin{aligned}
 & \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \int_1^2 r dr d\theta = \int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta \cdot \int_1^2 r dr = (\theta \Big|_{\pi/4}^{3\pi/4}) \cdot \left(\frac{r^2}{2} \Big|_1^2 \right) \\
 &= \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\pi}{4}.
 \end{aligned}$$

③



$$\mathcal{D} = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$$

$$= \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}$$

$$\begin{aligned} \iint_D \sin(y^2) dA &= \int_0^1 \int_0^y \sin(y^2) dx dy = \int_0^1 \sin(y^2) \left(x \Big|_0^y\right) dy \\ &= \int_0^1 \sin(y^2) \cdot y dy = \int_0^1 \sin(u) \cdot \frac{1}{2} du = -\frac{1}{2} \left(\cos u \Big|_0^1\right) = -\frac{1}{2} [\cos(1) - 1] \\ &\quad (u = y^2 \Rightarrow du = 2y dy) \\ &= \frac{1 - \cos(1)}{2}. \end{aligned}$$

④ a) O sólido pode ser descrito em coord. cilíndricas como

$$E = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq z \leq 2\}.$$

Assim,

$$\iiint_E f(x, y, z) dV = \int_0^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \cdot r dr d\theta dz$$

$$\begin{aligned} b) V &= \int_0^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^3 r dr d\theta dz = \int_0^2 dz \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \int_0^3 r dr \\ &= 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{r^2}{2} \Big|_0^3\right) = \frac{9}{2}\pi. \end{aligned}$$

⑤ A região de integração pode ser descrita em coord. esféricas como

$$E = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 2 \leq \rho \leq 3, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi\}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \iiint_E x^2 + y^2 \, dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_2^3 (\rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta) \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi \\ &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_2^3 \rho^4 \sin^3 \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_2^3 \rho^4 \, d\rho \cdot \int_0^\pi \sin^3 \phi \, d\phi \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{\rho^5}{5} \Big|_2^3 \right) \cdot \int_0^\pi \sin \phi \cdot \sin^2 \phi \, d\phi = \frac{422}{5} \pi \cdot \int_0^\pi \sin \phi (1 - \cos^2 \phi) \, d\phi \\ &\quad (\text{u} = \cos \phi \Rightarrow du = -\sin \phi \, d\phi) \\ &= \frac{422}{5} \pi \left(-\int_1^{-1} 1 - u^2 \, du \right) = \frac{422}{5} \pi \cdot \int_{-1}^1 1 - u^2 \, du = \frac{422}{5} \pi \left(u - \frac{u^3}{3} \Big|_{-1}^1 \right) \\ &= \frac{422}{5} \pi \left[1 - \frac{1}{3} - (-1) + \frac{(-1)^3}{3} \right] = \frac{422}{5} \pi \cdot \left(2 - \frac{2}{3} \right) = \frac{422}{5} \pi \cdot \frac{4}{3} = \frac{1688}{15} \pi. \end{aligned}$$